


СҮРЬЕЭГҮЙ ДЭЛХИЙ

Lung tree note

Mongolia 



Stop TB Partnership KOREA



Агуулга



I хэсэг. Сүрьеэ өвчний тухай ерөнхий ойлголт


- Сүрьеэ өвчин гэж юу вэ? Сүрьеэ өвчин үүсгэгч нянгийн хэлбэр, шинж чанар юу вэ?
- Сүрьеэгийн халдвар хэрхэн тархдаг вэ?
- Сүрьеэ өвчний үед ямар илрэх шинж тэмдэгүүд илэрдэг вэ?
- Сүрьеэ өвчнийг хэрхэн оношлодог вэ?
- Сүрьеэ өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ?

II хэсэг. Сүрьеэ өвчний эмчилгээ

- Сүрьеэ өвчнийг хэрхэн эмчилдэг вэ?
- Сүрьеэтэй өвчтөнийг эмчлэх эмчилгээний үе шатуудын талаар хангалттай мэдээлэлтэй байна уу?
- Сүрьеэ өвчнийг анагаах ямар төрлийн эм, тарилга байдаг вэ?
- I түвшний эмчилгээний үед ямар гаж нөлөө илэрч болох вэ?
- Сүрьеэгээр өвчилсөн тохиолдолд анхаарах зүйлс юу вэ?
- Нуугдмал сүрьеэ өвчин гэж юу вэ? Хэрхэн эмчлэгддэг вэ?
- Сүрьеэгийн халдвартай өвчтөний гэр бүлд зориулсан “Нуугдмал сүрьеэг илрүүлэх шинжилгээ - төсөл” гэж юу вэ?


III хэсэг. Эмэнд дасал сүрьеэ

- Эмэнд дасалтай сүрьеэ хэрхэн үүсдэг вэ?
- Эмэнд дасал сүрьеэгийн олон янз байдаг уу?
- Олон эмэнд дасал сүрьеэг хэрхэн эмчилдэг вэ?
- II түвшний эм, тарилгаас үүсч болох үндсэн гаж нөлөө юу вэ?
- Сүрьеэгийн эсрэг шинэ төрлийн эм, тарилга байгаа юу?
- Сүрьеэ өвчин эдгэрсний дараа дахин өвчлөх магадлалтай юу?




I хэсэг.

Сүрьеэ өвчний тухай ерөнхий ойлголт




“ Сүрьеэ өвчин гэж юу вэ¹? ”

- Сүрьеэ нь сүрьеэгийн нян болох микобактери хэмээх нянгаар халдварлан, үрэвслийн голомтын ихэнх буюу 85% нь хүний биеийн уушги болон бусад эрхтэнд үүсгэгддэг өвчин юм.




85%




“ Сүрьеэ өвчин үүсгэгч нянгийн хэлбэр, шинж чанар юу вэ¹? ”

- Сүрьеэ өвчин үүсгэгч микобактери нь савханцар хэлбэртэй, удаан үрждэг халдварт нян юм. Уг өвчин хүн төрөлхтнийг өвчлүүлж буй хамгийн эртний өвчнүүдийн нэг юм.




- ✓ Сүрьеэ өвчин нь микобактери хэмээх нянгаар үүсгэгддэг.
- ✓ Микобактери нь савханцар хэлбэртэй, удаан хугацааны турш амьдрах чадвартай, хуваагдан үрждэг нян юм.



“Сүрьеэгийн халдвар хэрхэн тархдаг вэ?”

• Сүрьеэгийн нян хүнээс хүнд амьсгалын замаар халдварладаг.


- 1 Сүрьеэ өвчтэй хүнийг ярих, ханиах, найтаахад эргэн тойронд нь их хэмжээний сүрьеэгийн нян тархаж байдаг.
- 2 Уг нян агаарт тархсан хэвээр үлддэг
- 3 Өвчтөнтэй ойр байсан хүн уг нянтай агаараар амьсгалсанаар халдвар авч, улмаар уг нян уушгинд нэвтэрч өвчлүүлдэг.



Сүрьеэ өвчнийг хэн ч тусах магадлалтай гэсэн үг үү?

Яг тийм. Тиймээс сүрьеэ өвчнийг эрт илрүүлж, тохирох эмчилгээг хийх нь маш чухал.






“ Сүрьеэ өвчний үед ямар илрэх шинж тэмдэгүүд илэрдэг вэ? ”

• Өвчний үед илрэх үндсэн шинж тэмдэгүүд


- **Ханиах** 2 ба түүнээс дээш долоо хоногоор ханиавал сүрьеэгийн шинжилгээ өгөх
- **Цусан ханиалга** Цустай цэрээр ханиах
- **Амьсгал боогдох** Бага зэрэг хөдлөхөд ч амьсгал боогдон багтрах
- **Толгой эргэх ядрах** Амархан ядрах,бие сульдах
- **Халуурах хөлрөх** Халуурах, шөнөөр хөлрөх



Би 2 долоо хоног тасралтгүй ханиалгалаа.
Яагаад юм бол?


Та ядарч жин хасагдсан харагдаж байна.
Хэрэв та 2-с дээш долоо хоног ханиалгаж байгаа бол би танд сүрьеэгийн шинжилгээ өгөхийг зөвлөж байна.





“Сүрьеэ өвчнийг хэрхэн оношлодог вэ?”

- Сүрьеэг оношлоход хамгийн оновчтой шинжилгээ бол цэрний түрхэцийн шинжилгээ юм. Мөн үтрээний түрхэцийн шинжилгээ болон бусад төрлийн эд эс, молекул биологийн шинжилгээнүүдээр оношлогддог.



Түүнчлэн бусад төрлийн шинжилгээнүүд өгч болно.

- Рентген шинжилгээ



Цээжний рентген шинжилгээ сүрьеэг оношлоход ашигладаг.

- Туберкулины арьсан дээрх сорил



сүрьеэ өвчний нянг илрүүлэхэд ашиглагддаг.


- Эмэнд дасал сүрьеэг оношлох тест



Сүрьеэ өвчнийг эмэнд дасал болсон эсэхийг оношлох шинжилгээ нь өвчтөнд эмчилгээг тохируулахад тустай.



- ✓ Сүрьеэг оношлоход хамгийн оновчтой шинжилгээ бол цэрний шинжилгээ юм.
- ✓ Сүрьеэ өвчний эсрэг эмэнд дасал болсон эсэхийг оношлох шинжилгээ нь өвчтөнд тохирох эмчилгээг олоход хэрэглэгддэг.



“ Сүрьеэ өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ?¹ ”

• Сүрьеэ өвчний эсрэг БЦЖ тарилга

- БЦЖ вакцин нь сүрьеэ өвчний эсрэг биеийн дархлааг сайжруулахад хэрэглэгддэг.
- Уг вакцин нь ихэвчлэн бага насны хүүхэд болон нярай хүүхдүүдийг сүрьеэ өвчний халдвар авахаас урьдчилан сэргийлдэг.
- Вакциныг нярай хүүхдүүдэд төрснөөс хойш 1 сарын дотор хийлгэх шаардлагатай.




• Биеийн дархлаа сайжруулалт

- Ядарч эцэх, сэтгэлээр унах, их хэмжээгээр биеийн жин хасагдсанаас биеийн дархлаа муудах нь сүрьеэ өвчний халдвар авах нөхцлийг бүрдүүлдэг.
- Эрүүл зөв хооллож, биеийн эсэргүүцлээ сайжруулах, дархлааг тэтгэх нь чухал.
- Архи тамхинаас татгалзах хэрэгтэй.

Сүрьеэ өвчнөөс
урьдчилан сэргийлж
болох уу?

Бололгүй яахав. Нярай хүүхдийг
төрснөөс хойш нэг сарын дотор БЦЖ
вакцинд хамруулах нь чухал. Мөн бие
ийн дархлааг дэмжих хэрэгтэй.






II хэсэг.

Сүрьеэ өвчний эмчилгээ





“ Сүрьеэ өвчнийг хэрхэн эмчилдэг вэ¹? ”



Сүрьеэгийн нян зөвхөн сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээгээр устгагддаг. Сүрьеэ өвчин 3-4 үе шат бүхий эмчилгээг 6-аас дээш сарын хугацаанд тууштай хийсний үр дүнд эдгэрдэг.



Эмчийн зөвлөгөө зааваргүйгээр сүрьеэгийн эмчилгээг зогсоож болохгүй. Эмийг эмчийн зөвлөсөн зааврын дагуу, тогтмол цаг хугацаанд нь уух нь чухал.



Сүрьеэ өвчний эмчилгээ эмч, эрүүл мэндийн ажилтны хяналтан дор үргэлжлэх ёстой. Эмчилгээний явц, ахиц болон эмийн гаж нөлөөг шалгаж, 2-3 сар тутам цээжний рентген болон цэрний шинжилгээг авдаг.



- ✓ Сүрьеэ өвчинд зөв эмчилгээ хийвэл эдгэрэх бүрэн боломжтой.
- ✓ Сүрьеэ өвчнийг олон төрлийн цогц эмийг удаан хугацааны турш хэрэглэсний үр дүнд эмчлэнэ.
- ✓ Сүрьеэ өвчнийг эмчилгээний зааврын дагуу удаан хугацаанд тасалдалгүй эмчлэх нь чухал.
- ✓ Өвчний эдгэрэлтийг цээжний рентген болон цэрний түрхэцийн шинжилгээгээр давтамжтайгаар шалгаж тодорхойлно.



“ Сүрьеэтэй өвчтөнийг эмчлэх эмчилгээний үе шатуудын талаар хангалттай мэдээлэлтэй байна уу? ”


◎ Зорилт:

- Сүрьеэгийн өвчтөнд тохирох цогц эмчилгээг хийх ба эмийн гаж нөлөө байгаа эсэхийг хянах
- Өвчтөнг эмчилгээг бүрэн дуусгахад дэмжлэг үзүүлэх болон өвчний эхний үед цаашид хүндрэхээс сэргийлэх

◎ Дэлгэрэнгүй

- Шинээр сүрьеэгээр өвчилсөн өвчтөнд 2 буюу түүнээс дээш долоо хоногийн турш хяналтат эмчилгээ хийх
- Өвчтөн бүрийн нөхцөл байдал, боломжийг харгалзан үзэж эмчилгээ хийх

◎ Өвчтөнд туслах менежментийн арга замууд



Эмчилгээний хянагч ажилтан нь өвчтөний эмчилгээ, эмчилгээний явц, цагийн хувиар ийг хянаж зохицуулах, өвчтөнтэй утсаар х олбогдох, сануулах, аливаа эмийн гаж нөлөө илэрч байгаа эсэхийг хянахад тусална.



Гар утсаар өвчтөнтэй шууд харилцах

Өвчтөн гар утсандаа (TB Zero) нэртэй аппликейшн суулгаснаар өөрийн эмчилгээ, эм уух явцийг хянагч эмнэлэгийн ажилтан руу видео хэлбэрээр илгээн харилцана.



Өөрийн биеэр ирж уулзах

Өвчтөн эмнэлэг болон эрүүл мэндийн төвүүд дээр өөрийн биеэр очиж эмчилгээ, эмийн гаж нөлөөний талаар ярилцаж зөвлөгөө авах боломжтой.

◎ Эмчилгээний шууд хяналт

- Эм олгох
- Эмээс шалтгаалсан сөрөг өөрчлөлт, эмчилгээг түр зогсоох



“Сүрьеэ өвчнийг анагаах ямар төрлийн эм, тарилга байдаг вэ?”

- Сүрьеэ өвчтөний эмчилгээг “I түвшний” буюу хамгийн үр дүнтэй, эмийн гаж нөлөө багатай болон “II түвшний” буюу хүндэрсэн, шаардлагатай тохиолдолд зөвлөдөг эмийн гаж нөлөө ихтэй эмчилгээ гэж ангилдаг
- Мөн үр дүн, эмийн үйлчлэх үйлдлээс нь хамааран сүрьеэ өвчний эсрэг эмийг 5 бүлэгт хуваагддаг.

Сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээ - бүлэг 1

- I түвшний эм, эмийн бэлдмэл буюу сүрьеэгийн эсрэг үйлчилгээ сайтай, элдэв гаж нөлөө багатай үндсэн эмүүд ордог.



Изониазид



Рифампин



Этамбутол



Пиразинамид



Рифабутин

Сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээ - бүлэг 2, 3, 4, 5 (II түвшний эмчилгээ)

Өвчтөн сүрьеэгийн эмэнд дасал болсон, эмийн гаж нөлөө их тохиолдолд, мөн I түвшний эмчилгээ үр дүнгүй үед хэрэглэнэ.

● Сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээ - бүлэг 2 (Тарилга)



Канамицин



Амикацин



Капреомици



Стрептомицин

● Сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээ - бүлэг 3 (Хинолины бүлгийн эм)



Левифлоксацин



Моксифлоксацин



Офлоксацин

● Сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээ - бүлэг 4 (II түвшний сүрьеэгийн эсрэг эм)



Профионами



Циклосерин



Парааминосалицилийн хүчил (ПАС)

● Сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээ - бүлэг 5 (Заавал эмчийн хяналтан дор)



Бедаквилин



Клофазимин



Линезолид



Амоксицилин




Кларитромицин



Имипемем


* Эмийн хэлбэр дүрс үйлдвэрлэгчээс хамааран өөрчлөгдөж болно.



“ I түвшний эмчилгээний үед ямар гаж нөлөө илэрч болох вэ? ”

Сүрьеэгийн эмийн гаж нөлөөнөөс үүсэх хамгийн их тохиолддог сөрөг нөлөө бол элэгний хордолт юм. Үүний үр дүнд үүсэх шинж тэмдэг, илрэх байдал нь өвчтөн бүрт өөр байж болно.

© Элэгний хордолт (Изониазид Рифампин Пиразинамид)



толгой эргэх



хавагнах



арьс шарлах

Үүсэх шинж тэмдэг, илрэх байдал нь өвчтөн бүрийн эмчилгээнээс шалтгаалж өөр өөр байж болно.



Арьс загатнах, гар хөл бадайрах, эрвэг нэх



Үе мөч өвдөх



Шээс, нулимс улаан болох



хараа муудах



Изониазид



Рифампицин




Пиразинамид



Этамбутол



- ✓ Сүрьеэгийн эмчилгээний явцад үүсч болох эмийн гаж нөлөөний тухай ойлголтой байх нь чухал.
- ✓ Гаж нөлөөнөөс шалтгаалаад эмчилгээгээ зогсоож болохгүй.
- ✓ Илэрч буй эмийн гаж нөлөөг эмчтэйгээ зөвлөж шийдвэрлэх нь чухал.



“ Сүрьеэгээр өвчилсөн тохиолдолд анхаарах зүйлс юу вэ? ”



● Маск зүүх

Бусад хүмүүст халдварлахаас сэргийлж маск зүүнэ.



● Архи тамхинаас татгалзах

нь сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээг амжилттай болоход нөлөөлнө.



Амин дэм, тэжээллэг сайтай хоол хүнс хэрэглэснээр

биеийн дархлаа сайжирна.



✓ Сүрьеэтэй өвчтөн үндсэн дэглэмүүдийг сахих нь хүмүүст сүрьеэ өвчнийг халдаахаас сэргийлж буй хэрэг юм.



“ Нуугдмал сүрьеэ өвчин гэж юу вэ? ” Хэрхэн эмчлэгддэг вэ?

● Нуугдмал сүрьеэ өвчин гэж юу вэ?



Сүрьеэгийн нянг
йн халдвар



Шинж тэмдэгүүд,
халдвар



Биеийн дархлаа
сулрах үед сүр
еэгийн нян идэв
хжилт

- Нуугдмал сүрьеэгийн нян өвчтөний биед нуугдаж байдаг.
- Нуугдмал сүрьеэгийн нян тээсэн өвчтөн бусдад халдаадаггүй ба өөрт нь аливаа шинж тэмдэг илэрдэггүй.
- Түрхэцийн шинжилгээний хариу болон цээжний рентген зураг хэвийн байна.

● Нуугдмал сүрьеэ өвчний эмчилгээ

- Хэдэн сарын турш 1~2 төрлийн эмчилгээ хийгдэж байж идэвхтэй сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан хамгаална.

Сүрьеэгийн халдвар
авсан ч ямар нэгэн
шинж тэмдэг илрэхг
үй байж болох уу?



Тийм байж болно.

Үүнийг нуугдмал сүрьеэ өвчин гэдэг.
Энэ төрлийн сүрьеэ бусдад халддаггүй
ба аливаа шинж тэмдэг илэрдэггүй.
Ихэнх тохиолдолд ямар нэгэн эмчилгээ
хийх шаардлагагүй байдаг ч сүрьеэгийн нян
идэвхжих магадлалтай хүмүүс 1~2 төрлийн
эмчилгээ хийлгэж сүрьеэ өвчин
идэвхжихээс урьдчилан сэргийлж
болно.





“Сүрьеэгийн халдвартай өвчтөний гэр бүлд зориулсан “Нуугдмал сүрьеэг илрүүлэх шинжилгээ - төсөл” гэж юу вэ¹?”

● Ач холбогдол

- Сүрьеэгийн халдвартай өвчтөний гэр бүл, найз нөхөд, хамтран ажиллагсад сүрьеэгийн халдвар авч болзошгүй.
- Биеийн дархлаа муудахад нуугдмал сүрьеэгийн нян идэвхжих боломжтой.

● Ерөнхий

- Уг төсөл нь сүрьеэгийн халдвартай өвчтнүүдийн гэр бүл, болон ойр харилцаж байсан хүмүүсийг нуугдмал сүрьеэгийн нянтай эсэхийг тогтоох шинжилгээ өгөхөд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж тусалдаг.


● Дэлгэрэнгүй

- Эрүүл мэндийн төв, эмнэлэгүүдэд сүрьеэ өвчний халдвар авсан нь оношлогдсон өвчтөнүүдээс “Ойр харилцаж байсан хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт” анкетийг бөглүүлнэ.
- Сүрьеэгийн өвчтөнтэй 1 сарын дотор ойр хавьталд байсан хүмүүс эрүүл мэнд төвүүд болон бусад газруудад үнэгүй шинжилгээ хийлгэх боломжтой.
- Сүрьеэгийн шинжилгээ: цээжний рентген, цэрний түрхэцийн, нянгийн
- Нуугдмал сүрьеэгийн нянг илрүүлэх шинжилгээ: туберколин арьсны шинжилгээ

Нуугдмал сүрьеэгийн нянг илрүүлэх үндэсний хэмжээний төсөл байдаг уу?


Тийм, байдаг. Өвчтний гэр бүл болон ойр харилцаж байсан хүмүүсийг сүрьеэгийн нянгаар халдварласан эсэхийг тогтоох шинжилгээ байдаг.






III хэсэг.

Эмэнд дасал сүрьеэ





“Эмэнд дасалтай сүрьеэ хэрхэн үүсдэг вэ?”

- Эмэнд дасалтай сүрьеэ нь сүрьеэгийн 1-с дээш эмд тэсвэртэй байдаг.
- Ихэнх тохиолдолд өвчтөн эмийг зааврын дагуу уугаагүйгээс үүддэг. Үүнд:
 - Өвчтөн эмчилгээний заавар дүрмийг чанд мөрдөхгүй, эмчилгээгээ тасл асан бол
 - Эмчилгээний жор буруу эсвэл буруу эмчилгээ хийлгэвэл
 - Өвчтөн эмэнд дасал сүрьеэтэй өвчтнөөс нянгийн халдвар авсан бол
- Эмэнд дасал сүрьеэ болон хүндэрсэн тохиолдолд сүрьеэгийн эсрэг эм үйлчлэхээ болино гэсэн үг.




Эмэнд дасал сүрьеэ гэж юу вэ?



Эмэнд дасал сүрьеэ нь сүрьеэгийн эсрэг 1 буюу түүнээс дээш эмэнд тэсвэртэй нянгаас үүсдэг. Гол шалтгаан нь эмчилгээг эрт дуусгах, эм уух заавар дүрмийг дагаж мөрдөхгүй байх зэрэг юм.





“Эмэнд дасал сүрьеэгийн олон янз байдаг уу¹?”



Олон Эмэнд Дасал Сүрьеэ (ОЭДС)


Энэ нь изионамид, рифампицины хослолд тэсвэртэй тохиолдлыг хэлнэ. Энэ тохиолдолд II түвшний эмчилгээтэй хавсарсан ч эмчилгээний үр дүн 50% магадлалтай байдаг.

Хэт Олон Эмэнд Дасал Сүрьеэ (ХОЭДС)

Изониазид, рифампицины хослолоос гадна аль нэг II түвшний бүлэг эмэнд дасал буюу тарилга, хинолины бүлгийн эмд тэсвэртэй байхыг хэлнэ.



- ✓ ОЭДС нь изионамид, рифампицин эмд тэсвэртэй тохиолдлыг хэлнэ.
- ✓ ХОЭДС нь тарилга, хинолины бүлгийн эм, эмчилгээнд тэсвэртэй байна.



“Олон эмэнд дасал сүрьеэг хэрхэн эмчилдэг вэ?”

Изионамид, рифампицин зэрэг эмд нэгэнт тэсвэртэй болсон нянг ихэвчлэн II түвшний эмчилгээ хийгддэг.

● ОЭДС-г эмчимлэх эрчимт эмчилгээ

- Пиразинамид + 4 төрлийн II түвшний эмнүүд (тарилгыг оролцуулан)
- 8 сарын турш





“ 2-р эгнээний эмнүүдээс үүсэх үндсэн
гаж нөлөө нүүд юу вэ³⁻⁵? ”

Сүрьеэгийн Эсрэг Эмчилгээнүүд	Хэлбэр, дүрс	Гаж нөлөөнүүд
Бүлэг 2	Тарилгууд 	Чихний үрэвсэл, бөөрний үрэвсэл, амны дотор хэсэг хорсох
Бүлэг 3	Левифлоксацин 	Гэдэс дүүрэх, Толгой өвдөх, толгой эргэх, үе мөч янгинах
	Моксифлок сацин 	
	Офлоксацин 	
Бүлэг 4	Циклосерин 	Сэтгэл санаагаар унах, сэтгэл мэдрэлийн өвчлөл тусах
	Протионамид 	Гэдэс дүүрэх, элэгний
	ПАС 	Хоолнд дургүй болох, дотор муухайрах, бөөлжих, гэдэс өвдөх, элэг хордох
Бүлэг 5	Линезолид 	Цусны эс багасалх гар хөл бадайрах, сулбайх
	Бедаквилин 	Зүрхний хэм алдах, амьсгал давчдах, элэг хордох
	Деламанид 	Зүрхний хэм алдагдах, дотор муухайрах, бөөлжих, нойргү

* Эм үйлдвэрлэгчээс шалтгаалж эмийн зураг өөрчлөлттэй байж



“Сүрьеэгийн эсрэг шинэ төрлийн эм, тарилга” байгаа юу⁴⁻⁷?



Бэдаквалин^{4,6}

Бэдаквалин эм нь微生物ийг дарангуйлах эм нь А ТП (аденозин 5-трипосфит) хэмээх сүрьеэгийн эрчим х үч үйлдвэрлэгч ферментийн задралын хурдыг сааруулах ач холбогдолтой. Сүүлийн үеийн эмнэлгийн туршилтаар уг эмийг хэрэглэсэн ОЭДС-тэй өвчтөнгүүд сүрьеэгийн нянгийн үржил удааширч байгаа нь батлагдсан.

Бэдаквалин эмийг өдөрт 400мг-аар хоёр 7 хоног, дараа нь 200 мг-аар 7 хоногт 3 удаагийн давтамжтайгаар 22 дахь 7 хоног хүртэл ууна. Дээд тал нь 6 сар уух бөгөөд хоолтой хамт ууж хэрэглэх нь илүү үр дүнтэй байна.




Деламанид^{5,7}

Деламанид сүрьеэгийн эсийн нэг хэсэг болох миколик эсийн задралыг сааруулах үйлчилгээтэй. Сүүлийн үеийн эмнэлгийн туршилтаар уг эмийг хэрэглэсэн ОЭДС-тэй өвчтөнгүүд эмчилгээний 2 сарын дараах цэрний түрхэцийн шинжилгээгээр илаарших хурд ердийн сүрьеэгийн эмчилгээнээс илүү байгаа нь батлагджээ.

Насанд хүрэгчид уг эмийг өдөрт 100мг-аар өдөрт хоёр удаа 24 долоо хоног хүртэл хоолны хамт ууна.





“Сүрьеэ өвчин эдгэрсний дараа дахин өвчлөх магадлалтай юу¹?”


Бүрэн эдгэсэн хүмүүсийн 3% орчим нь дахин өвчлөх магадлалтай байдаг. Биеийн дархлаа суларснаар сүрьеэгийн нян дахин идэвхижих тохиолдол бий.

Дахин өвчлөх эрсдлийн хүчин зүйлс

- Биеийн онцлог • хүрээлэн буй орчин
- өдөр тутмын зуршил • стресс
- Биеийн дархлаа муутгах суурь өвчингүүд (чихрийн шижин, элэгний өвчин, ДОХ)
- Биеийн дархлаа муудахад нөлөөлөх эмчилгээ (гемодиализ, адренкордикол стероид, дархлаа дарангуйлагч, хорт хавдрын эсрэг эмчилгээ)
- өндөр нас
(Настай хүмүүс ихэвчлэн дахин тусах магадлалтай)

Суурь өвчтэй өвчтөнгүүд эмчийн хяналтад эрчимт эмчилгээ хийлгэх хэрэгтэй. Мөн амин дэмээр баялаг хоол хүнс хэрэглэн, сэтгэл санааны хямралаас өөрийгөө хамгаалж сүрьеэгээр дахин өвчлөхөөс сэргийлэх хэрэгтэй.





Lung tree care

Хэвлэлийн Газарын тухай Мэдээлэл

1. Korean National Tuberculosis Association 57 Baumoero 6(yuk)-gil, Seocho-gu, Seoul, 137-900, Korea Tel.+82-2-2633-9461 2. Janssenkorea 25F, LS Yongsan Tower, Hangangro 2-Ga, Yongsan-Gu, Seoul 140-702, Korea Tel.+82-2-2094-4500

Хавсралт

1. CDC Korea, TB Zero. Available at <http://tbzero.cdc.go.kr/tbzero/main.do> Accessed November 3,2015. 2. Korean National Tuberculosis Association. Tuberculosis Guidebook Brochure. Korean National Tuberculosis Association>Reference Library>Promotional Education Data. Available at http://www.knta.or.kr/reference/promotion/promotionView.asp?idx=73&search_type=&search_text=&page=2 Accessed November 3,2015. 3. Tuberculosis Guideline Revision Committee. Tuberculosis Guideline 2014. The Korean Academy of Tuberculosis and Respiratory Disease, CDC Korea. 4. Sirturo® PI 5. Delyba® PI 6. Diacon AH, Pym A et al., Multidrug-resistant tuberculosis and culture conversion with bedaquiline. N Engl J Med. 2014 Aug 21;371(8):723-32 7. Gler MT, Skripconoka V et al., Delamanid for multidrug-resistant pulmonary tuberculosis. N Engl J Med. 2012 Jun 7;366(23):2151-60